[Menaces dans la Loire]

- Modification, dégradation, fragmentation et destruction de son habitat ;
- Mortalité piscicole le privant de sa principale source de nourriture ;
- Pollution des eaux ;
- Dérangement par les activités humaines.

[© Erik Marr]

[Chapitres du SDAGE Loire Bretagne qui répondent à ces menaces]

- Repenser les aménagements de cours d'eau ;
- Réduire la pollution par les nitrates ;
- Réduire la pollution organique et bactériologique ;
- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
- Préserver la biodiversité aquatique.

[SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux]

Dans le cadre de son Réseau Départemental Eau, la FRAPNA Loire élabore des fiches sur les espèces à enjeux inféodées aux milieux aquatiques dans la Loire.

Partenaire financier : Agence de l'eau Loire Bretagne

[© FRAPNA Loire - 2015]

FRAPNA Loire - 11 rue René Cassin - 42100 Saint-Etienne
04 77 41 46 60 - www.frapna-loire.org

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

ESPÈCE À ENJEUX

[Oiseau]

Taille : 16 à 17 cm
Envergure : 24 à 26 cm
Poids adulte : 34 à 46 g

[© Martin Mollet / Saxifraga]

Listes rouges (classification de l'UICN)			
Europe	**France**	**Rhône-Alpes**	**Loire**
VU	LC	VU	X
Législation			
Directive Habitats (AI) Convention de Berne (AII, III)	Arrêté du 29/10/2009	X	X

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
LC : *Low Concern* (préoccupation mineure)
VU : *Vulnerable* (vulnérable)
A : Annexe

[Habitat]

Le martin-pêcheur vit au bord des plans d'eau et des rivières, avec des eaux calmes, limpides, peu profondes et poissonneuses.

Il affectionne les rives arborées et les poteaux qui lui servent de perchoirs.



[© Mark Zekhuis / Saxifraga]

[Régime]

Le martin-pêcheur se nourrit principalement de petits poissons (vairon, épinoche, chabot, truite, vandoise...).

Il peut compléter son menu avec des insectes, des crustacés (gammares) et des batraciens.

[Répartition dans la Loire 2007 - 2015]



[carte © NASA/JPL/Caltech - Données www.faune-loire.org]

[Prédateurs]

Les prédateurs naturels du martin-pêcheur sont l'épervier et le faucon hobereau.

Les jeunes encore dans le nid doivent craindre les renards, les rats et les hermines.

[Comportement]

Il guette ses proies depuis un perchoir ou en pratiquant le vol stationnaire au-dessus de l'eau.

Lorsqu'il a repéré une proie, il plonge et la saisit avec son bec puissant. Il regagne alors son perchoir, puis frappe violemment le poisson contre une branche pour l'assommer avant de l'avaler.

Le martin-pêcheur est un migrateur partiel, hivernant en Europe. Ce sont les jeunes et les femelles qui sont le plus aptes à migrer vers le sud.

[Reproduction]

Le martin-pêcheur niche dans un terrier creusé dans des berges meubles et abruptes.

Il y a 2 à 3 couvées par an de 6 ou 7 œufs.

L'incubation, assurée par les deux parents, dure 24 à 27 jours.

Les jeunes sont nourris par les parents et quittent le terrier à l'âge de 23 à 27 jours.