

## Menaces dans la Loire

- Modification, dégradation, fragmentation et destruction de son habitat (drainage des zones humides...);
- Boisement naturel des tourbières et des prairies humides (déprise agricole);
- Surpâturage.



[Boisement naturel d'une tourbière © Yves Thonnérieux]

# [ Chapitres du SDAGE Loire Bretagne qui répondent à ces menaces ]

- Maîtriser les prélèvement d'eau;
- Préserver les zones humides :
- Préserver les têtes de bassin versant ;
- Préserver la biodiversité aquatique.

[ SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ]

Dans le cadre de son Réseau Départemental Eau, la FRAPNA Loire élabore des fiches sur les espèces à enjeux inféodées aux milieux aquatiques dans la Loire.

Partenaire financier : Agence de l'eau Loire-Bretagne



# Nacré de la canneberge Boloria aquilonaris



# Lépidoptère

Envergure: 32 à 36 mm

Cycle de développement : 1 à 2 ans



Listes rouges (classification de l'UICN)			
Europe	France	Rhône-Alpes	Loire
LC	NT	Χ	Χ
Législation			
X	Arrêté du 23/04/2007	X	X

UICN: Union Internationale pour la Conservation de la Nature

LC: Low Concern (préoccupation mineure) NT: Near Threatened (quasi-menacée)

X : Absence de liste rouge ou de réglementation







### [ Habitat ] ·

Le nacré de la canneberge vit dans les tourbières, généralement peu boisées et situées à proximité de milieux aquatiques permanents.



[ © André Ulmer / FRAPNA Loire ]

# [Comportement]


Le nacré de la canneberge est un papillon diurne (rhopalocère). Une seule génération se développe par an.

Sa période de vol s'étend de juin à août, lorsque le temps est ensoleillé. Cette espèce peut parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre son lieu de ponte.



[ Sur des fleurs de canneberge © Hans Dekker / Saxifraga ]

### [ Répartition dans la Loire 2008–2012 ]



# [ Prédateurs ]

Les oiseaux et les araignées figurent parmi les prédateurs du nacré de la canneberge.

# [ Régime ]

Les chenilles se nourrissent de fleurs et de jeunes pousses de canneberge, leur plante hôte. Les adultes aspirent le nectar des plantes (potentille des marais, cirse des marais...).



[ Canneberge © Diane Corbin / FRAPNA Loire ]

# [ Reproduction ]

La femelle pond ses oeufs sur les feuilles ou les tiges de la canneberge. Les chenilles passent l'hiver dans les buttes de sphaignes (mousses).



[Rouge-queue noir © Ph. Rouyer et S. Bissardon]